

ဝက်သက်ရောဂါ

၎င်းသည် အဖုအပိမ့်အနီစက်

အနည်းငယ်ထခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ



ဝက်သက်ရောဂါသည် အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

ဝက်သက်ရောဂါလက္ခဏာများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝင်သည်မှာ-



အဖျားကြီးခြင်း
(104°F အထက် ရှိတ်တရက် အဖျားတက်နိုင်သည်)



ချောင်းဆိုးခြင်း



နှာရည်ယိုခြင်း



မျက်လုံးနီခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် မျက်ရည်ယိုခြင်း



အဖုအပိမ့်အနီစက်ထခြင်း
(ရောဂါလက္ခဏာပြသည့်နေ့မှ 3-5 ရက်အတွင်း အနီစက်များထွက်သည်)

ဝက်သက်ရောဂါသည် ဆိုးရွားပြင်းထန်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။

ဝက်သက်ရောဂါသည် အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းမှု (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) နှင့် သေဆုံးခြင်းအပါအဝင် ပြင်းထန်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို ခံစားရစေနိုင်ပါသည်။



ဝက်သက်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 5 ဦးတွင် 1 ဦးသည် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။



ဝက်သက်ရောဂါရှိသည့်ကလေး 20 ဦးတွင် 1 ဦးသည် အဆုတ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဝက်သက်ရောဂါရှိသည့် ကလေးငယ်များ သေဆုံးရသည့် အဖြစ်အပျက်ဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။



ဝက်သက်ရောဂါရှိသူ 1,000 ဦးတွင် 1 ဦးသည် ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ၎င်းကြောင့် ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဝက်သက်ရောဂါရှိသူ 1,000 ဦးတွင် 1 ဦးမှ 3 ဦးအထိ သေဆုံးနိုင်ပါသည်။

ဝက်သက်ရောဂါသည် အလွန်ကူးစက်လွယ်ပြီး

ဝက်သက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူက ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် နှာချေခြင်း ပြုလုပ်သောအခါ ရောဂါပိုးများ လေထဲသို့ပျံ့နှံ့ကာ ကူးစက်ပါသည်။

ဝက်သက်ရောဂါရှိသူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူ 10 ဦးအနက် 9 ဦးကို ရောဂါကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ဝက်သက်ရောဂါကို တားဆီးကာ ကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်

ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် 12-15 လသားနှင့် 4-6 နှစ်အရွယ်များတွင် ဝက်သက်-ပါးချိုတ်ရောင်-ဂျိုက်သိုးရောဂါ (MMR) ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံထားသင့်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးနှံခြင်းသည် ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကို 97% အထိ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။



Vaccines for Children
Iowa HHS



Vaccines for Adults
Iowa HHS



IOWA
MEDICAL
SOCIETY

Original content created by CDPH

