

ROUGEOLE

CE N'EST PAS QU'UNE PETITE ÉRUPTION



La rougeole peut être dangereuse, surtout pour les bébés et les jeunes enfants.

Les symptômes typiques de la rougeole incluent :



Forte fièvre
(pouvant dépasser 40 °C / 104 °F)



Toux



Nez qui coule



Yeux rouges ou larmoyants



Éruption cutanée
(apparaît généralement 3 à 5 jours après le début des symptômes)

La rougeole peut être grave.

Elle peut entraîner de graves complications de santé, notamment une pneumonie, un gonflement du cerveau (encéphalite), voire la mort.



1 personne sur 5 atteinte de la rougeole devra être hospitalisée.



1 enfant sur 20 atteint de la rougeole contractera une pneumonie, la principale cause de décès chez les jeunes enfants atteints de la rougeole.



1 personne sur 1 000 atteinte de la rougeole développera une encéphalite, pouvant entraîner des lésions cérébrales.



Entre 1 et 3 personnes sur 1 000 mourront de la rougeole.

La rougeole est extrêmement contagieuse

et se transmet dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Une personne atteinte peut contaminer 9 personnes non vaccinées sur 10 autour d'elle.

La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la rougeole

Les enfants doivent recevoir le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l'âge de 12 à 15 mois, puis une deuxième dose entre 4 et 6 ans. Deux doses assurent une protection de 97 % contre la rougeole.

Vaccins pour les enfants
Iowa HHS



Vaccins pour adultes
Iowa HHS



**IOWA
MEDICAL
SOCIETY**

Original content created by CDPH

