

طفح جلدي بسيط

الحصبة ليست مجرد

الحصبة مرض خطير، خاصةً على الرضع والأطفال الصغار.



تشمل أعراض الحصبة عادةً ما يلي:



الطفح الجلدي

(يتطور بعد 3-5 أيام من بدء ظهور الأعراض)



احمرار العين أو

زيادة إفراز الدموع في العينين أو كلاهما



سيلان الأنف



السعال



الحُمى

(قد تصل درجة حرارة الجسم إلى 104 درجات فهرنهايت)

الحصبة مرض خطير.

يمكن أن تسبب الحصبة مضاعفات صحية شديدة الخطورة، مثل الالتهاب الرئوي والوذمة الدماغية (التهاب الدماغ) وحتى الوفاة.

يُصاب طفل واحد من بين كل 20 طفل مصاب بالحصبة بالالتهاب الرئوي، وتُعد حالات الوفاة بسبب هذا المرض أكثر شيوعًا بين الأطفال الصغار.



سيتم احتجاز 1 من كل 5 أشخاص مصابون بالحصبة في المستشفى.



يموت ما بين 1 إلى 3 أشخاص من كل 1000 شخص مصاب بالحصبة.



يُصاب 1 من بين كل 1000 شخص مصاب بالحصبة بالوذمة الدماغية، التي قد تؤدي إلى تلف الدماغ.



الحصول على اللقاح هو الطريقة المثلى للوقاية من الإصابة بمرض الحصبة

يجب أن يمنح الطفل الذي يتراوح عمره بين 12 و15 شهرًا لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، ثم تعطى الجرعة الثانية عندما يتراوح عمر الطفل بين 4 و6 سنوات. تبلغ فاعلية جرعتين من اللقاح 97% في الوقاية من الحصبة.



Vaccines for Children
Iowa HHS



Vaccines for Adults
Iowa HHS



الحصبة مرض شديد العدوى

وتنتشر الإصابة من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. يمكن أن يصيب الشخص المصاب بالحصبة 9 من أصل 10 من مخالطيه إذا لم يتلقوا اللقاح.

IOWA
MEDICAL
SOCIETY

Original content created by CDPH