

سرخکان

صرف دانچه خورد نیست

سرخکان می‌تواند خطرناک باشد، مخصوصاً برای نوزادان و اطفال خردسال.



علائم سرخک معمولاً شامل موارد زیر است:



دانچه

(3-5 سالگی شروع
علائم بوجوجه می‌آید)



چشم‌های سرخ
و/یا آب پر



ریزش بینی



سرفه



تب بالا

(درجه‌های حرارت بدن ناممکن‌الایه بیشتر
از 104°F یا 40°C می‌آید)

سرخکان می‌تواند جدی باشد.

سرخکان می‌تواند سبب عوارض شدید صحتی بشمول سینه بغل، تورم مغزی (انسفالیت) و مرگ گردد.

1 از هر 20 طفل مبتلا به سرخکان به سینه بغل مبتلا میشوند که معمولترین علت مرگ ناشی از سرخکان در اطفال جوان است.



1 از 5 نفر که به سرخکان مبتلا میشوند در شفاخانه بستری خواهند شد.



1 تا 3 از 1,000 نفر مبتلا به سرخکان خواهند مرد.



1 از هر 1,000 نفر مبتلا به سرخکان دچار تورم مغزی خواهند شد که ممکن است منجر به آسیب مغزی شود.



واکسیناسیون بهترین روش برای جلوگیری از مریضی سرخکان است

یک طفل باید در سنین 12-15 ماهگی و 4-6 سالگی واکسین سرخکان-کله چرک-روبیلا (MMR) را دریافت کند. دو دوز 97% در مقابل سرخکان

سرخکان خیلی ساری است

و زمانی که یک شخص مصاب سرفه می‌کند یا عطسه می‌زند از طریق هوا پخش میشود. یک شخص مبتلا به سرخکان میتواند آنرا به 9 از 10 نفر واکسین نشده اطراف خود انتقال دهد.



Vaccines for Children
Iowa HHS



Vaccines for Adults
Iowa HHS



Original content created by CDPH