

شري

دا يوازي لږې ګرېمکې نه دي

شري خطرناک کيدی شي، په ځانګړې توګه کوچنيانو او ماشومانو لپاره.




بخار

(د علايمو تر پيلېدو
3-5 ورځې وروسته
څرګندېږي)



سرې او يا
اوبلنې سترګې



بهبډونکې پوزه



توخی



لوړه تبه

(ممکن تر 104°F ډېر
لوړه شي)

د شري په علايمو کې
لاندې ذکر شوي شامل دي:

شري جدي دی.

شري د شديدو روغتيايي اختلاطاتو سبب کېږي لکه سينه بغل، د مغز پړسوب (انسفالايټس) او مرګ.


له هرو 20 کسانو څخه 1 پر شري اخته ماشوم سينه بغل،
په تنکيو ماشومانو کې د مرګ تر ټولو عام لامل پيدا کوي.



له 5 کسانو څخه 1 په شري اخته کسبه په روغتون
کې بستر کېږي.



له هرو 1000 کسانو څخه 1 تر 3 پر شري اخته
کسمره کېږي.



له هرو 1000 کسانو څخه 1 پر شري اخته کس د مغز
پړسوب پيدا کوي چې ښايي د مغز خرابېدو سبب شي.



واکسين د شري د مخنيوي تر ټولو غوره لار ده.

ماشوم بايد د شري، ډيډغوري او روبېلا (measles, mumps, and rubella, MMR) واکسين په 12-15 مياشتو او 4-6 کلنۍ کې ولگوي.
دوه ډوزه د شري پر وړاندې 97% اغېزمن دي.



Vaccines for Children
Iowa HHS



Vaccines for Adults
Iowa HHS



شري ډېر ساري دی

او کله چې پر دغې ناروغۍ يو
اخته کس توخيزي يا پرنجی
کوي، نو د هوا له لارې
خپرېږي. پر شري يو اخته کس
په شاوخوا کې ياده ناروغي له
10 څخه 9 غېر واکسين شوو
کسانو ته خپروي.

IOWA
MEDICAL
SOCIETY

Original content created by CDPH