

# که ستاسو ماشوم ناراحتی لري، څه باید وکړئ؟

## زه فکر کوم زما ماشوم تبه لري. څه باید وکړم؟

- تبه دا معنا لري چې د ماشوم معافیتي سیستم "فعال شوی." دا کیدای شي ځکه وي چې واکسین خپل کار کوي یا ځکه چې ماشوم ته انتان (ناروغي) پیدا شوې ده.
- د خپل ماشوم تودوخه چک کړئ. د ترمامیتر د کارولو لارښوونې تعقیب کړئ یا د healthychildren.org پر ویبپاڼه کې "څنگه د خپل ماشوم تودوخه (تبه) وگورو" برخه وگورئ.
- که د تودوخې درجه  $100.4^{\circ}$  فارنهایت ( $38^{\circ}$  سلسیوز) یا تر دې لوړه وي، نو دا تبه گنل کېږي.

## د تبه یا ناراحتۍ لپاره درمل:

- دا درمل د تبه او ناراحتۍ په کمولو کې مرسته کوي:
- ایبوپروفن (د برانډ نومونه Advil، Motrin) - شاوخوا ۶ ساعته اغېز لري
- استامینوفین (د برانډ نوم Tylenol) - شاوخوا ۴ ساعته اغېز لري
- ماشومانو او له ۱۸ کلونو کم عمره ځوانانو ته اسپرین مه ورکړئ!
- د درملو اندازه باید د ماشوم پر وزن او د روغتیايي چمتو کونکي پر لارښوونو ولاړه وي؛ مهرباني وکړئ لاندې معلومات او د دویم مخ جدولونه وگورئ.

## دلته نورې لارې هم دي چې د تبه په کمولو کې مرسته کوي:

- خپل ماشوم ته ډېر مایعات ورکړئ.
- ماشوم ته سپک کالي واغونډئ. ماشوم مه پوښئ او مه یې په کلکو جامو کې نغاړئ.

## دلته نورې لارې دي چې د پرسیدلي، گرم، او سور لاس یا پښې آرامولو کې مرسته کوي:

- پر دردناکه ځای باندې یو پاک، یخ، لوند ټوکر کېږدئ ترڅو آرام ورکړي. دا کار د ورځې ۳ ځله، هر ځل د ۱۰ دقیقو لپاره وکړئ.
- هره ورځ د واکسین ځای وگورئ. که له ۱-۲ ورځو وروسته ښه نه شي، له خپل روغتیايي چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

## که ستاسو ماشوم ډېر ناروغ ښکاري:

- دا پاڼه د طبي مشورې بدیل نه ده. که ستاسو ماشوم ډېر ناروغ ښکاري، له خپل روغتیايي چمتو کونکي څخه طبي مشوره وغواړئ.

ادامه لري په بل مخ کې

روغتیايي چمتو کونکی: لطفاً لاندې معلومات ډک کړئ.

که د ماشوم تودوخه  $^{\circ}\text{F}$  \_\_\_\_\_ یا  $^{\circ}\text{C}$  \_\_\_\_\_ یا تر دې لوړه وي، یا که تاسو پوښتنې لرئ، نو له خپل روغتیايي چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ. د روغتیايي چمتو کونکي د اړیکې شمېره: \_\_\_\_\_ دواړې (د اړتیا په صورت کې) \_\_\_\_\_ د درمل نوم/ډول \_\_\_\_\_ هر \_\_\_\_\_ ساعت وروسته که اړتیا وي ورکړئ.



www.immunize.org/catg.d/p4015.pdf  
آیټم #3/29/2023/P4015

د pdf لپاره دا سکین کړئ

د متخصصینو لپاره www.immunize.org / د عامو خلکو لپاره www.vaccineinformation.org

# له واکسین کولو وروسته...

ستاسو ماشوم ښایي له واکسین کولو وروسته اضافي مینې او پاملرنې ته اړتیا ولري. ځینې واکسینونه چې ماشومان له جدي ناروغيو څخه ساتي، ممکن لنډمهاله ناراحتی هم رامنځته کړي. دلته د هغو پوښتنو ځوابونه دي چې ډېری مور او پلار یې له واکسین وروسته لري. که دا پاڼه ستاسو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، له خپل روغتیايي چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

## واکسین ممکن لږ درد ورکړي... خو ناروغي ډېر درد لري!

که تاسو لاندې پوښتنو ته "هو" ووايئ، نو سمدلاسه له خپل روغتیايي چمتو کونکي یا بیرنيو خدماتو سره اړیکه ونیسئ:

- ایا ستاسو ماشوم داسې تبه لري، چې ستاسو روغتیايي چمتو کونکي ورته ویلي وي چې د اندېښنې وړ ده؟
- ایا ستاسو ماشوم ژیر یا بې حسه ښکاري؟
- ایا ستاسو ماشوم له ۳ ساعتونو څخه زیات ژاړي او هیڅ نه تمېږي؟
- ایا د ماشوم بدن لږزېږي، تشنج کوي یا ناڅاپي خوځښتونه لري؟
- ایا ستاسو ماشوم ډېر بې حرکت یا بې واکنشه ښکاري؟

مهرباني وکړئ د ماشوم لپاره د تبه یا درد د کمولو د درملو د سمې اندازې معلوماتو لپاره دوهم مخ وگورئ.

IOWA  
MEDICAL  
SOCIETY

Immune.org

## د درد او تېبې د کمولو لپاره درمل او دوزونه

### مناسب درمل انتخاب کړئ، او دوز په دقیقه توګه اندازه کړئ.

- تل باید د استامینوفین یا ایبوپروفن مایع درملو ورکولو پر مهال مناسب اندازه کوونکی وسیله وکاروئ (لکه Advil, Motrin).
- د درملو په پاکټ کې ضمیمه وسیله وکاروئ. که دا وسیله مو له لاسه ورکړې وي، له خپل روغتیایي چمتو کوونکي یا فارمسيسټ سره مشوره وکړئ.
- د خوراک وخت چمچې د دقیقې اندازې لپاره نه دي. هیڅکله د درملو لپاره د خوراک چمچه مه کاروئ.

### د خپل ماشوم د درملو جدي زیاتوالي د مخنیوي لپاره دا دوه ګامه پورته کړئ.

- خپل ماشوم ته له لاندې جدول څخه د زیات مقدار استامینوفین یا ایبوپروفن مه ورکوئ. د دې دواګانو ډېر استعمال خطرناک کیدی شي.
  - کله چې خپل ماشوم ته استامینوفین یا ایبوپروفن ورکوئ، نو ورته د درملتون څخه د ټوخي یا زکام د درملو دواګانې مه ورکوئ. دا ځکه چې د ټوخي او زکام درمل اکثراً استامینوفین یا ایبوپروفن لري، چې د درملو زیاتوالی رامنځته کوي.
- له خپل روغتیایي چمتو کوونکي یا فارمسيسټ څخه وپوښتنئ چې کوم درمل ستاسو ماشوم ته غوره دي او څومره باید ورکړئ.
  - دوز باید د ماشوم د وزن په اساس وي. که د ماشوم وزن درته نه وي معلوم، د عمر له مخې دوز ورته وټاکئ. تر سپارښتنل شوې اندازې ډېر درمل مه ورکوئ.
  - که د دوز مقدار یا نورو اندېښنو په اړه پوښتنې لرئ، له خپل روغتیایي چمتو کوونکي یا فارمسيسټ سره اړیکه ونیسئ.

## استامینوفین (Tylenol یا نور برانډونه): څومره باید ورکړئ؟

هر ۴ څخه تر ۶ ساعتونو پورې، چې اړتیا وي ورکړئ، په ۲۴ ساعتونو کې له ۴ دوزونو څخه زیات مه ورکوئ (تر هغه چې ستاسو روغتیایي چمتو کوونکی ډول ونه وایي).

د ماشوم وزن	د ماشوم عمر	د نوزادانو مایع	د ماشومانو مایع دوا	د ماشومانو ژوول کېدونکي	د ماشومانو حل کېدونکي پاکټونه	د لویانو ټابلیټونه	د لویانو ټابلیټونه
۰ تر ۱۱ پونډه (تر ۵ کیلوګرامه پورې)	۰ تر ۳ میاشتې عمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲ تر ۱۷ پونډه (۶ تر ۷ کیلوګرامه)	۴ تر ۱۱ میاشتې عمر	۲،۵ ملی لیتر	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸ تر ۲۳ پونډه (۸ تر ۱۰ کیلوګرامه)	۱۲ تر ۲۳ میاشتې عمر	۳،۷۵ ملی لیتر	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴ تر ۳۵ پونډه (۱۱ تر ۱۵ کیلوګرامه)	۲ نه تر ۳ کالونو پورې	۰	۵ ملی لیتر	۱ ټابلیټ	۰	۰	۰
۳۶ تر ۴۷ پونډه (۱۶ تر ۲۱ کیلوګرامه)	۴ نه تر ۵ کالونو پورې	۰	۷،۵ ملی لیتر	۱/۲ ټابلیټونه	۰	۰	۰
۴۸ تر ۵۹ پونډه (۲۲ تر ۲۶ کیلوګرامه)	۶ نه تر ۸ کالونو پورې	۰	۱۰ ملی لیتر	۲ ټابلیټونه	۲ پاکټونه	۱ ټابلیټ	۰
۶۰ تر ۷۱ پونډه (۲۷ تر ۳۲ کیلوګرامه)	۹ نه تر ۱۰ کالونو پورې	۰	۱۲،۵ ملی لیتر	۲ ټابلیټونه	۲ پاکټونه	۱ ټابلیټ	۰
۷۲ تر ۹۵ پونډه (۳۳ تر ۴۳ کیلوګرامه)	۱۱ کاله	۰	۱۵ ملی لیتر	۳ ټابلیټونه	۳ پاکټونه	۱ ټابلیټ	۱ ټابلیټ
۹۶ پونډه (۴۴ کیلوګرامه) یا زیات	۱۲ کلن یا تر هغه زیات عمر	۰	۱۰ ملی لیتر + ۱۰ ملی لیتر = ۲۰ ملی لیتر	۴ ټابلیټونه	۰	۱ ټابلیټ	۲ ټابلیټونه

\* دا جدول یوازې هغه محصولات شاملوي چې په پراخه کچه په متحده ایالاتو کې شتون لري.

ماخذ: <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/medication-safety/Pages/Acetaminophen-for-fever-and-pain.aspx>

## ایبوپروفن (Advil, Motrin)، یا نور برانډونه: څومره باید ورکړئ؟

هر ۶ نه تر ۸ ساعتونو وروسته ورکړئ، چې اړتیا وي، په ۲۴ ساعتونو کې له ۴ څخه زیات دوز مه ورکوئ (تر هغه چې ستاسو روغتیایي چمتو کوونکی بل ډول ونه وایي).

د ماشوم وزن	د ماشوم عمر	د نوزادانو څاڅکي	د ماشومانو مایع دوا	د ماشومانو ژوول کېدونکي ټابلیټونه	د ماشومانو ټابلیټونه	د لویانو قوي ټابلیټونه
۰ تر ۱۱ پونډه (تر ۵ کیلوګرامه پورې)	۰ تر ۵ میاشتې عمر	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲ تر ۱۷ پونډه (۶ تر ۷ کیلوګرامه)	۶ تر ۱۱ میاشتې عمر	۱،۲۵ ملی لیتر	۲،۵ ملی لیتر	۰	۰	۰
۱۸ تر ۲۳ پونډه (۸ تر ۱۰ کیلوګرامه)	۱۲ تر ۲۳ میاشتې عمر	۱،۸۷۵ ملی لیتر	۴ ملی لیتر	۰	۰	۰
۲۴ تر ۳۵ پونډه (۱۱ تر ۱۵ کیلوګرامه)	۲ نه تر ۳ کالونو پورې	۲،۵ ملی لیتر	۵ ملی لیتر	۲ ټابلیټونه	۰	۰
۳۶ تر ۴۷ پونډه (۱۶ تر ۲۱ کیلوګرامه)	۴ نه تر ۵ کالونو پورې	۳،۷۵ ملی لیتر	۷،۵ ملی لیتر	۳ ټابلیټونه	۰	۰
۴۸ تر ۵۹ پونډه (۲۲ تر ۲۶ کیلوګرامه)	۶ نه تر ۸ کالونو پورې	۵ ملی لیتر	۱۰ ملی لیتر	۴ ټابلیټونه	۲ ټابلیټونه	۱ ټابلیټ
۶۰ تر ۷۱ پونډه (۲۷ تر ۳۲ کیلوګرامه)	۹ نه تر ۱۰ کالونو پورې	۰	۱۲،۵ ملی لیتر	۵ ټابلیټونه	۲ ټابلیټونه	۱ ټابلیټ
۷۲ تر ۹۵ پونډه (۳۳ تر ۴۳ کیلوګرامه)	۱۱ کاله	۰	۱۵ ملی لیتر	۶ ټابلیټونه	۳ ټابلیټونه	۱/۲ ټابلیټونه
۹۶ پونډه (۴۴ کیلوګرامه) یا زیات	۱۲ کلن یا تر هغه زیات عمر	۰	۱۰ ملی لیتر + ۱۰ ملی لیتر = ۲۰ ملی لیتر	۸ ټابلیټونه	۴ ټابلیټونه	۲ ټابلیټونه

\* دا جدول یوازې هغه محصولات شاملوي چې په متحده ایالاتو کې په پراخه کچه شتون لري.

ماخذ: <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/medication-safety/Pages/Ibuprofen-for-fever-and-pain.aspx>